
**ЗООПЛАНКТОН, ЗООБЕНТОС,
ЗООПЕРИФИТОН**

УДК 574.586(28)+574.587(285.2):592

**НЕМАТОДЫ МЕЙОБЕНТОСА И ПЕРИФИТОНА ПРИТОКОВ
РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА**

© 2019 г. И. А. Скальская^а, *, В. Г. Гагарин^а

^аИнститут биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук,
пос. Борок, Некоузский р-н, Ярославская обл., Россия

*e-mail: skalskaya@ibiw.yaroslavl.ru

Поступила в редакцию 26.01.2017 г.

После доработки 16.02.2018 г.

Принята к публикации 29.05.2018 г.

В различных биотопических группировках беспозвоночных малых рек видовое богатство и численность нематод различались. Перифитон был беднее, чем мейобентос. Наряду с общими видами отмечен ряд червей, найденных только в обрастаниях или только в мейобентосе. Значительное увеличение видового богатства, разнообразия экологических групп и обилия червей в мейобентосе и перифитоне малых рек наблюдалось в зонах загрязнения органическими веществами антропогенного и зоогенного происхождения. Биоценотическая и функциональная роль нематод в этих группировках зависела в большей степени от уровня обеспеченности пищей, чем от ряда других факторов среды, лимитирующих их развитие.

Ключевые слова: нематоды, мейобентос, перифитон, притоки, Рыбинское водохранилище

DOI: 10.1134/S0320965219060159