

УДК 56(113.3):571.52

RUSOPHYCUS (HEMISPHERICHNUS) COMMUNITAS – НОВЫЙ ТАКСОН ИХНОФОССИЛИЙ В ОРДОВИКЕ ТЫВЫ

© 2022 г. Н. В. Сенников*

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск, 630090 Россия

*e-mail: sennikovnv@ipgg.sbras.ru

Поступила в редакцию 20.07.2021 г.

После доработки 11.01.2022 г.

Принята к публикации 11.01.2022 г.

В ордовикских терригенных образованиях Тывы нередко встречаются следы жизнедеятельности организмов. Наиболее богатое местонахождение ихнофоссилий обнаружено в разрезе Чиргаки в западной части региона. Там наряду со спорадически встречающимися ранее известными в других регионах мира таксонами ихнофоссилий, такими как *Dimorphichnus* Seilacher, *Helmintopsis* Heer, автором статьи определены преобладающие по численности ихнофоссилии, которые следует отнести к новому виду нового подрода рода *Rusophycus* Hall.

Ключевые слова: ордовик, ихнофоссилии, дагыршемийская свита, Тыва

DOI: 10.31857/S0031031X22040110

ВВЕДЕНИЕ

Ордовикские отложения имеют в Тыве достаточно широкое распространение и представлены, главным образом, терригенными образованиями. Число местонахождений, содержащих в разрезах фаунистические остатки, крайне незначительно. В разрезах некоторых свит сами органические остатки и их следы полностью отсутствуют, а в других имеются только находки следов жизнедеятельности организмов. Информация об ихнофоссилиях и об обстановках седиментации ордовикских бассейнов Тывы содержится в ряде работ (Владимирская, 1960; Задорожная, 1961; Сенников В.М., 1977; Kulkov, 1991; Сенников Н.В., 2005, 2018, 2019; Sennikov, 2006; Сенников, Обут, 2018; Sennikov, Obut, 2019).

МАТЕРИАЛ

Наиболее значительные площади распространения ордовикских отложений в Тыве занимает шемушдагская серия, подразделяющаяся на дагыршемийскую, аянгатинскую и адырташскую свиты. В настоящей работе описываются ихнофоссилии, встреченные в стратотипе дагыршемийской свиты, в нижней ее подсвите в районе пос. Чиргаки (рис. 1, 2).

Литотипы пород дагыршемийской свиты шемушдагской серии Тывы, по которым можно судить о фациальных обстановках формирования осадочных тел со следами жизнедеятельности организмов, имеют следующие характеристики:

а) грунты с воздействием приливов-отливов; б) грунты с высокой и средней гидродинамической энергией; в) мягкие грунты; г) грунты, подвергающиеся высыханию (субаэральные условия); д) линзовидные тела песчаных тел; е) косая слоистость; ж) регрессивный тренд осадконакопления; з) отсутствие самих фаунистических остатков; и) незначительное морфологическое разнообразие ихнофоссилий; к) биотурбация только отдельных слоев с умеренным и низким коэффициентами.

В изученной коллекции дагыршемийских следов жизнедеятельности организмов доминируют ихнофоссилии биоэрозионного типа на плотном (firmground) субстрате. Они имеют положительный гипорельеф (*Hypichnia*) и представляют из себя ямки-экскавации в виде неглубоких полусфер с желобками на их дне и боковых стенках. Такие ямки-экскавации относятся к структурам заполнения ямок-углублений в нижележащих слоях. Ордовикские тувинские *Hypichnia* соседствуют в сближенных группировках с другими ямками-экскавациями.

ОПИСАНИЕ ИХНОФОССИЛИЙ

Ихнород *Rusophycus* Hall, 1852

Типовой вид — *Fucoides bilobata* Vanuxem, 1842 из нижнего кембрия Пакистана.

Диагноз. Двухлопастные (*bilobate*) формы, напоминающие по конфигурации кофейные зерна, как правило, со срединным углублением. У




Рис. 1. Схема расположения тувинского ордовикского разреза Чиргаки, содержащего рассмотренные ихнофоссилии: А — крупнейшие тектонические зоны, В — поля выходов ордовикских отложений, С — местоположение района исследований.

ихнофоссилий *Rusophycus* Hall морщинистые пересекающиеся ребра образуют по отношению к центральной, обычно прогнутой и извилистой, осевой части углы 70° – 80° (Vanuxem, 1842; Hall, 1852). У некоторых представителей ихнорода *Rusophycus* (ряд австралийских и боливийских форм ихновида *R. latus*) (Webby, 1983; Davies et al., 2007) срединное углубление не имеет прямолинейной направленности и в рельефе выражено крайне слабо.

С о с т а в р о д а. Два подрода: *Rusophycus* Hall и новый ихноподрод *Rusophycus* (*Hemisphaerichnus*) *isubgen. nov.* Первый подрод имеет широкое стратиграфическое распространение — весь палеозой многих регионов мира, а второй пока известен только в нижнем ордовике Тывы.

З а м е ч а н и я. Другие известные ихнороды из эволютических группировок *Domichnia* (жилищаноры и охотничьи ямы), *Cubichnia* (следы покоя), строящие неглубокие норы, и *Repichnia* (следы направленного передвижения) (Микулаш, Дронов, 2006; Seilacher, 2007; Buatois, Mangano, 2011), отличаются от нового ихноподродового таксона следующими параметрами. Представители ихнорода *Bergaueria* Prantl имеют неглубокие, цилиндрические, вертикальные норы с ровными стенками, заканчивающимися полусферическим дном. У этих ихнофоссилий каких-либо отпечатков желобков на стенках нет.

Представители этологической группировки *Repichnia* (следы направленного перемещения) в составе ихнорода *Cruziana* d'Orbigny имеют линейную двухлопастную (*bilobate*) форму, реже ямки-экскавации. Пересекающиеся ребра у ихнорода *Cruziana* образуют по отношению к центральной, обычно прогнутой и относительно прямой осевой части, углы 30° – 60° .

Ихноподрод *Rusophycus* (*Hemisphaerichnus*) Sennikov, *isubgen. nov.*

Н а з в а н и е подрода от *hemisphaera* *греч.* — полусфера (по форме нор-экскаваций).

Т и п о в о й вид — *Rusophycus* (*Hemisphaerichnus*) *communitas isp. nov.*

Д и а г н о з. Простые, неглубокие, вертикальные или со слабым наклоном ямки-экскавации округлых очертаний, реже вытянуто-овальные. Общая форма ямок-экскаваций полусферическая, реже усеченной полусферы. На стенках нор видны отпечатки сегментов тела организма-хозя-

Система	Отдел	Ярус	Свита	Подсвита	Литология	Ихнофоссилии
Ордовикская	Средний	Даринский	Дагыршемийская	Верхняя	Красноцветные песчаники, алевролиты, в основании конгломераты 200 м	
	Нижний	Флоский		Нижняя	Сероцветные песчаники, алевролиты, в верхней части сероцветные и красноцветные аргиллиты, косослоистые, со следами ряби, усыхания, каплями дождя, “ледовыми” трещинами 800–900 м	 <i>Rusophycus</i> (<i>Hemisphaerichnus</i>) subgen. nov., <i>Dimorphichnus</i> Seilacher, <i>Helmintopsis</i> Heer

Рис. 2. Общее строение стратотипического разреза дагыршемийской свиты Чиргаки.

ина. Ямки-экскавации могут быть одиночными и формировать группировки многочисленных сближенных (до соприкасающихся) углублений.

Организмы-хозяева выкапывали ямки-экскавации в плотном (firmground) осадке, оставшемся после отлива. Занимаемая ямками-экскавациями *Rusophycus* (*Hemisphaerichnus*) isubgen. nov. площадь поверхности слоя (плотность “ихнофоссильного освоения”) составляет не более 5–10%. В целом, такие “ихнофоссилиеносные” слои составляют не более 1–2% от общей мощности разреза.

Учитывая незначительную глубину ямок-экскаваций, нет оснований относить тувинские ихнофоссилии *Rusophycus* (*Hemisphaerichnus*) isubgen. nov. к норам-жилищам (*Domichnia*) или охотничьим норам. Предварительно их можно классифицировать как ямки отдыха-укрытия (*Cubichnia*), как и у всех представителей рода *Rusophycus*. На применение “организмами-хозяевами” исследуемых ямок-экскаваций для временного (не постоянного) отдыха-укрытия дополнительно указывает наблюдаемый феномен их многократного использования (незакономерно вкладывающиеся друг в друга отпечатки-слепки). При этом, как правило, “вторичное” и последующее использование ямок-экскаваций происходит организмами близкого по размеру к размеру организма первого “строителя-хозяина” такой ямки-экскавации.

Видовой состав. Типовой ихновид.

Сравнение. У форм рассматриваемого нового ихноподрода полностью отсутствует средин-

ное углубление. Таким образом, это “не двухлопастные” (non-bilobate) формы, обособленные внутри рода *Rusophycus* Hall в отдельный подрод *Rusophycus* (*Hemisphaerichnus*) isubgen. nov. Классические двухлопастные (bilobate) формы в составе рода *Rusophycus* Hall составляют номинативный подрод *Rusophycus* (*Rusophycus*) Hall.

З а м е ч а н и я. Поведенческие функции организмов-хозяев, строящих ямки-экскавации *Rusophycus* (*Hemisphaerichnus*), выражаются в частой концентрации их в группировки, что может указывать на их предрасположенность к групповому образу обитания.

Следует отметить одно обстоятельство, пока не нашедшее логического объяснения. В разрезе с многочисленными дагыршемийскими ихнофоссилиями в виде ямок-экскаваций, созданных организмами с ярко выраженным сегментированным телом, наблюдаются структуры ползания (*Repichnia*), с которыми, предположительно, можно было бы каким-то образом соотносить передвижения таких крупных организмов. Но следы ползания встречаются крайне редко.

Фациальная приуроченность ихнофоссилий *Rusophycus* (*Hemisphaerichnus*) isubgen. nov. выражается в их встречаемости в тонких терригенных осадках — аргиллитах, реже алевролитах, вблизи их границ с песчаниками. По этологическим особенностям изученные тувинские ихнофоссилии представляют собой структуры заполнения ямок-углублений в нижележащих слоях.

Rusophycus (Hemisphaerichnus) communitas Sennikov, isp. nov.

Табл. II, фиг. 1–8; табл. III, фиг. 1–8 (см. вклейку)

Название вида *communitas* *лат.* — группировка.

Голотип — Музей ИНГГ, № 2107/5; Тыва, водораздел рр. Улуг-Чиргакы и Б. Аянгаты, разрез “Чиргакы”, 16-ая пачка; нижний ордовик, флоский ярус, дагыршемийская свита, нижняя подсвита.

Описание. Обособленные ямки-экскавации, созданные отдельным индивидом организма-хозяина в виде четких полусфер, чаще их соприкасающиеся группировки в более крупных округлых и овальных образованиях — углублениях-выемках усеченной полусферической формы.

Размеры. Ямки-экскавации имеют размеры по длинной оси от 6–8 мм до 10 см, а по короткой оси от 4–6 мм до 9 см. Отношение ширины ямки-экскавации к ее длине в среднем 0.75, реже 1.0. Углубления-выемки, в которые группируются экскавации, имеют размеры от 3–5 см до 12 см.

Изменчивость и параметры, которые можно интерпретировать как возрастные изменения организмов-хозяев — это, прежде всего, длина, а так как они все полусферической формы, то и глубина экскаваций. Ямки-экскавации по их размерам разделены на три условные категории: мелкие (длина до 0.2–0.3 см), средние (длина до 2–4 см) и крупные (длина до 5–7 см). Возможно, что такое разделение можно интерпретировать как следствие жизнедеятельности юных форм, взрослых особей видового таксона средних размеров и геронтологических особей этого же вида или, что менее вероятно, взрослых особей другого видового таксона крупных размеров.

Отношение глубины экскаваций к их длине: у мелких 0.75, у средних 0.75, у крупных 0.4. Отношение глубины экскаваций к их ширине: у мелких 0.5, у средних 0.5, у крупных 0.55. Число отпечатков сегментов тела в экскавациях: у мелких 6–9, у средних 10–15, у крупных 10–20. Границы сегментов иногда слабо изгибаются, чаще строго дугообразные. Ширина сегментов отпечатков тела в экскавациях: у мелких 0.5–0.7 мм, у средних 1.5–3.0 мм, у крупных до 7–8 мм. Глубина отпечатка сегмента тела в экскавациях по отношению к разделяющей сегменты более узкой борозде 0.1–0.4 мм. Ширина борозд, разделяющих сегменты в экскавациях: у мелких 0.4–0.5 мм, у средних 2 мм, у крупных 4–5 мм.

Замечания. Новый тувинский ихнотаксон, кроме отсутствия двухлопастного строения, по своим параметрам (отношение глубины экскаваций к их длине или ширине, характеризующем слабо усеченную полусферу) отличается от всех других ихновидов рода *Rusophycus* Hall. По отношению длины к ширине экскавации новый ихнотаксон можно сравнить с ихновидом *R. leiferikssoni*

Bergström (*Bergström*, 1976; *Mangano*, *Buatois*, 2003; *Seilacher*, 2007). Сибирские ихнофоссилии *R. communitas* имеют величину этого параметра 0.75–1.0, а формы ихновидов *R. leiferikssoni* — 0.5–0.8. Кроме того, характерной особенностью для *R. leiferikssoni* является четко выраженная двухлопастность строения и сильный наклон экскаваций с глубоким узким концом, а у тувинского ихнотаксона экскавации практически вертикальны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По полученным и приведенным выше материалам можно сделать некоторые выводы:

I. По условиям обитания и стратегии поведения нового тувинского ордовикского ихнотаксона изученная коллекция его следов жизнедеятельности позволяет констатировать следующее. Для организмов, оставивших такие следы, было характерно: 1) поселение не на твердом (*hardground*), а на плотном (*firmground*) грунте, который они могли использовать для создания ямок-экскаваций; 2) вероятно, группировки ямок-экскаваций (углубления-выемки) создавались животными в микропонижениях рельефа дна палеобассейна, где при отливах оставались лужи воды — такое местообитание можно называть лужей-лежищем (возможно сходство с современными литоральными ваннами, не осушающимися при отливах); 3) создание компактных поселений (“оседлость”) — повышенная концентрация на ограниченной площади поверхности слоя; 4) зависимость от периодических процессов, выражающаяся в многократном посещении одних и тех же ямок-экскаваций (возможно, и одним и тем же индивидом или близким к нему по размерам сородичем), с пропечатыванием следов сегментов их тел поверх уже имеющих сегментированных отпечатков; 5) “стайность” особей одного размера, фиксируемая в нахождении внутри одного углубления-выемки только отпечатков “сеголеток”, или в другом месте исключительно отпечатков взрослых особей, или в третьем месте малочисленных отпечатков гигантских геронтических экземпляров организмов-хозяев; 6) создание компактных группировок ямок-экскаваций, в которых могла быть температура выше, чем у окружающего воздуха, а такая температура, судя по присутствию в породах ихнофоссиленосных слоев следов “морозных ледовых” трещин (Сенников, 2019), могла в ночное время опускаться ниже 0 градусов.

II. В отношении предположения о систематической принадлежности биологических объектов — организмов-хозяев следов жизнедеятельности ордовикских тувинских *Rusophycus* (*Hemisphaerichnus*) предварительно можно отметить следующее. В ряде работ убедительно показано, что многие *Rusophycus* Hall являются следами от-

дыха артропод – трилобитов (Orlowski et al., 1970; Orlowski, 1992; Aceñolaza, 2003; Mangano, Droser, 2004). Имеется информация (Mangano et al., 2020), что кроме трилобитов, такие следы в виде ямок-укрытий могли формировать (“создавать”) эуартроподы.

Ордовикские тувинские *Rusophycus* (*Hemisphaerichnus*) не могли “образовывать” не только отдыхающие артроподы (членистоногие), но и свернувшиеся их формы внутри ямок-экскаваций. В противном случае в тувинском материале должны были остаться отпечатки границ туловищных сегментов и плевральных шипов. Возможно, что “хозяевами” следов жизнедеятельности ордовикских тувинских *Rusophycus* (*Hemisphaerichnus*) были *Malacostraca* – высшие ракообразные, некоторые представители которых известны с кембрийского периода. Высшим ракообразным свойственны стайность и стратегия многократного использования собственных нор.

Описанная в работе коллекция ихнофоссилий хранится в ЦКП “Геохрон” при Ин-те нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН в г. Новосибирск под № 2107. Исследования проводились в рамках Госзадания РАН FWZZ-2022-0003.

Автор выражает признательность специалистам по палеозойским ихнофоссилиям Л. Бато (L. Buatois, Канада) и Х. Гутьеррес-Марко (J.-C. Gutiérrez-Marco, Испания) за ценные советы, полученные им при дискуссиях с этими коллегами в процессе работы над каменным материалом. Автор благодарит своих коллег О.Т. Обут, Н.Г. Изох, Т.В. Хлебникову, Д.А. Токарева за помощь в сборе тувинских ихнофоссилий. От А.В. Дронова и В.Б. Кушлиной на заключительном этапе работы над рукописью были получены ценные замечания, которые помогли улучшить качество изложения материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Владимирская Е.В. Ордовикские отложения Центральной и Западной Тувы // Зап. Ленингр. горн. ин-та. 1960. Т. 37. Вып. 2. С. 21–48.
- Задорожная Н.М. Стратиграфия ордовикских отложений юго-западной оконечности Кортубинского хребта // Матер. по региональной геологии Алтае-Саянской складчатой области. Л.: ВСЕГЕИ, 1961. С. 43–48 (Тр. ВСЕГЕИ. Нов. сер. Т. 58).
- Микулаш Р., Дронов А. Палеоихнология. Введение в изучение ископаемых следов жизнедеятельности. Прага: Изд-во Геол. ин-та Акад. наук Чешской Республики, 2006. 122 с.
- Сенников В.М. История развития структур южной части Алтае-Саянской складчатой области в ордовике. Барнаул: Алтайское книжн. изд-во, 1977. 135 с.
- Сенников Н.В. Ихнофашии и ихнофоссилии в нижнем палеозое Тувы // Эволюция жизни на Земле. Матер. III Междунар. симп. Томск: ТГУ, 2005. С. 158–160.
- Сенников Н.В. Фашиальная приуроченность, топономическая и этологическая характеристики ихнофоссилий дагыршемийской свиты среднего ордовика Тывы // Фундаментальная и прикладная палеонтология. Матер. LXIV сессии Палеонтол. об-ва при РАН. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2018. С. 111–113.
- Сенников Н.В. Лито- и ихнофашии дагыршемийской свиты раннего–среднего ордовика Тывы // Тр. Палеонтол. об-ва. Т. 2. М.: ПИН РАН, 2019. С. 133–145.
- Сенников Н.В., Обут О.Т. Экосистемы ордовикского бассейна Центральной Тывы // Матер. V Междунар. симп. “Эволюция жизни на Земле”, 12–16 ноября 2018. Томск: Издательский дом Томского госун-та, 2018. С. 117–119.
- Aceñolaza G.F. Olenidae (Trilobita) – *Rusophycus* isp.: organismo productor-traza fósil resultante. Ejemplos para el análisis en el Cambro/Ordovícico de la Cordillera Oriental Argentina // Ameghiniana. 2003. V. 40. № 4. P. 573–583.
- Bergström J. Lower Paleozoic trace fossils from eastern Newfoundland // Can. J. Earth Sci. 1976. V. 13. P. 1613–1633.
- Buatois L.A., Mangano M.G. Ichnology. Organism-Substrate Interactions in Space and Time. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2011. 358 p.
- Davies N.S., Sansom I.J., Albanesi G.L. et al. Ichnology, palaeoecology and taphonomy of a Gondwanan early vertebrate habitat: Insights from the Ordovician Anzaldo Formation, Bolivia // Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol. 2007. V. 249. P. 18–35.
- Hall J. Palaeontology of New-York. V. 2. Containing Descriptions of the Organic Remains of the Lower Middle Division of the New-York System (Equivalent in Part to the Middle Silurian Rocks of Europe). Albany: C. Van Benthuysen, 1852. 362 p.
- Kulkov N.P. The trace fossil *Thalassinoides* from the Upper Ordovician of Tuva // Lethaia. 1991. V. 24. P. 187–190.
- Mangano M.G., Buatois L.A. *Rusophycus leiferikssoni* Bergström en la Formación Campanario: implicancias en la paleoecología de planicies mareales cámbricas // APA. 2003. Publ. Especial 9. P. 65–84.
- Mangano M.G., Droser M.L. The ichnologic record of the Ordovician radiation // The Great Ordovician Biodiversification Event / Eds. B. Webby, F. Paris, M.L. Droser, I.G. Percival. N.-Y.: Columbia Univ. Press, 2004. P. 369–379.
- Mangano M.G., Ortega-Hernández J., Piñuela L. et al. Trace fossil evidence for infaunal moulting in a Middle Devonian nontrilobite euarthropod // Sci. reports. 2020. 10:5316. 15 p. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-62019-6>
- Orlowski S. Trilobite trace fossils and their stratigraphical significance in the Cambrian sequence of the Holy Cross Mountains, Poland // Geol. J. 1992. V. 27. P. 15–34.
- Orlowski S., Radwanski A., Roniewicz P. The trilobite ichno-coenoses in the Cambrian of the Holy Cross Mountains // Trace fossils / Eds. T.P. Crimes, J.C. Harper. Liverpool, 1970. P. 345–360 (Geol. J. Spec. Iss. № 3).
- Seilacher A. Trace Fossil Analysis. Berlin, Heidelberg, N.Y.: Springer, 2007. 226 p.

Sennikov N.V. Lower Ordovician paleogeographical environments and ichnofossils from Dagyr-Shemi Formation (Tuva region, Siberia, Russia) // Intern. Symp. "Palaeogeography and Global Correlation of Ordovician Events". IGCP 503 Project. Contributions. Novosibirsk, Russia (August 5–7, 2006). Novosibirsk: Publ. House of SB RAS, "Geo" Branch, 2006. P. 53–54.

Sennikov N.V., Obut O.T. Ecosystem reconstruction for the Ordovician Basin of the Central Tuva (South Siberia) // 13th Intern. Symp. on the Ordovician System: Contribu-

tions. Novosibirsk, Russia (July 19–22, 2019) / Eds. O.T. Obut, N.V. Sennikov. Novosibirsk: Publ. House of SB RAS, 2019. P. 183–185.

Vanuxem L. Geology of New York. Part. III. Comprising the Survey of the Third Geological District. Albany, 1842. 306 p.

Webby B.D. Lower Ordovician arthropod. Trace Fossils from western New South Wales // Proc. Linn. Soc. N.S.W. 1983. V. 107. № 2. P. 59–74.

Объяснение к таблице II

Фиг. 1–8. *Rusophycus* (*Hemisphaerichnus*) *communitas* isubgen. et isp. nov.: 1 – экз. Музей ИНГГ, № 2107/1, сближенные и частично накладывающиеся друг на друга нижние поверхности заполнения экскаваций с отпечатками одной размерности (нижняя поверхность слоя); 2, 7, 8 – экз. Музей ИНГГ, №№ 2107/2, 2107/7, 2107/8, боковые стороны поверхности заполнения полусферических выемок с многочисленными наложенными друга на друга экскавациями с сегментированными отпечатками, сформировавшимися при многократных посещениях экскаваций организмами-хозяевами близкой размерности; 5 – голотип Музей ИНГГ, № 2107/5; 3, 4, 6 – экз. Музей ИНГГ, №№ 2107/3, 2107/4, 2107/6, нижние поверхности заполнения полусферических выемок, с многочисленными, неоднократно посещаемыми экскавациями, оставленными сегментированными отпечатками организмов-хозяев близкой размерности; Тыва, водораздел рек Улуг-Чиргакы и Б. Аянгаты; дагыршемийская свита, флоский ярус.

Объяснение к таблице III

Фиг. 1–3, 5–8. *Rusophycus* (*Hemisphaerichnus*) *communitas* isubgen. et isp. nov.: 1, 5 – экз. Музей ИНГГ, №№ 2107/9, 2107/10, нижняя поверхность заполнения изолированной мелкой экскавации с сегментированными отпечатками организма-хозяина; 2, 3, 6, 8 – экз. Музей ИНГГ, №№ 2107/11, 2107/13, 2107/14, 2107/15, отпечатки нижней поверхности заполнения крупной полусферической выемки с многочисленными наложенными друга на друга сегментированными отпечатками, сформировавшимися при многократных посещениях экскаваций организмами-хозяевами; 7 – экз. Музей ИНГГ, № 2107/16, боковая сторона нижней поверхности заполнения одной крупной полусферической выемки с многочисленными наложенными друга на друга экскавациями с сегментированными отпечатками, сформировавшимися при многократных посещениях экскаваций организмами-хозяевами близкой размерности; Тыва, водораздел рек Улуг-Чиргакы и Б. Аянгаты; дагыршемийская свита, флоский ярус.

Фиг. 4. *Rusophycus* (?) sp., экз. Музей ИНГГ, № 2107/12, нижняя и боковая стороны вложенных друг в друга нижних поверхностей заполнения экскаваций с непроявленной сегментированностью отпечатков организмов-хозяев; Тыва, водораздел рек Улуг-Чиргакы и Б. Аянгаты; дагыршемийская свита, флоский ярус.

Rusophycus (*Hemisphaerichnus*) *communitas* – New Ichnofossils Taxon from the Ordovician of Tuva Region

N. V. Sennikov

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk, 630090 Russia

The traces of the vital activity of organisms are not uncommon in the Ordovician terrigenous deposits of Tuva. The richest location of ichnofossils was found in the Chirgaki section in the western part of the region. There, along with the taxa of ichnofossils that were previously known sporadically in other regions of the world, such as *Dimorphichnus* Seilacher, *Helmintopsis* Heer, the author of the article found the predominant numbers of trace fossils, which should be attributed to a new species of a new subgenus of the genus *Rusophycus* Hall.

Keywords: Ordovician, ichnofossils, Dagyrshemi Formation, Tuva

