

УДК 564.53:551.762

К РЕВИЗИИ ПЕРМСКИХ ЛУЧЕПЕРЫХ РЫБ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ. ЧАСТЬ 2

© 2022 г. А. С. Бакаев*

Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, Москва, 117647 Россия

*e-mail: alexandr.bakaev.1992@mail.ru

Поступила в редакцию 25.04.2022 г.

После доработки 01.06.2022 г.

Принята к публикации 01.06.2022 г.

Проведена ревизия части оригиналов пермских лучеперых рыб Европейской России из коллекции Д.Н. Есина, которая была передана в Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН (ПИН РАН). Приведены описания и изображения таксонов, изменивших первоначальный (присвоенный при первоописании) систематический статус: *Reticulolepis insolita* (переименован в *Strelinia insolita*), *Samarichthys nikolaevae* (переименован в *Acroctenolepis nikolaevae*), *Wardichthys inobilis* (младший синоним *Kargalichthys pritokensis*), *Amblypterina pectinata* (младший синоним *Isadia suchonensis*) и *Amblypterina grandicostata* (младший синоним *Isadia aristoviensis*). При этом изображение голотипов *Reticulolepis insolita* и *Samarichthys nikolaevae* приводится впервые.

Ключевые слова: Actinopterygii, чешуя, пермь, Восточная Европа, стратиграфия

DOI: 10.31857/S0031031X22060034

ВВЕДЕНИЕ

Среди палеоихтиологов, изучавших лучеперых рыб перми Европейской России, Дмитрий Николаевич Есин был одним из наиболее значимых специалистов (Бакаев, в печати). Из собственных сборов им был описан ряд новых таксонов пермских лучеперых рыб. Коллекция Есина после его смерти в 2003 г. была передана в ПИН РАН из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ), на базе которого и была собрана. До последнего момента коллекция не подвергалась ревизии, а хранилась под устаревшими номерами МГУ.

Всего в коллекции Есина находились оригиналы 12 описанных им видов рыб: *Wardichthys inobilis* Esin, 1993 (Есин, 1993), *Acropholis kamensis* Esin, 1995, *Kazanichthys golyushermensis* Esin, 1995, *Koinichthys ivachnenkoi* Esin, 1995, *Elonichthys contortus* Esin, 1995 (Есин, 1995a), *Acropholis silantievi* Esin, 1996, *Kazanichthys viatkensis* Esin, 1996, *Boreolepis tataricus* Esin, 1996, *Reticulolepis insolita* Mashin et Esin, 1996, *Acroctenolepis nikolaevae* Esin, 1996, *Amblypterina grandicostata* Esin, 1996, *A. pectinata* Esin, 1996 (Есин, Машин, 1996). При осмотре переданной коллекции оригинальные экземпляры *Koinichthys ivachnenkoi* и *Elonichthys contortus* обнаружить не удалось. Среди оставшихся таксонов некоторые сохранили свой систематический статус (*Acropholis kamensis*, *A. silantievi*, *Kazanichthys golyushermensis*, *K. viatkensis*,

Boreolepis tataricus) (Бакаев, 2022), а другие изменили его (*Wardichthys inobilis*, *Reticulolepis insolita*, *Acroctenolepis nikolaevae*, *Amblypterina grandicostata*, *A. pectinata*). В настоящей статье мы рассмотрим те таксоны, у которых изменился систематический статус (см. ниже).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Изучаемый материал представлен как изолированными чешуями хорошей и удовлетворительной сохранности (*Amblypterina grandicostata*, *A. pectinata*, *Reticulolepis insolita*), так и фрагментами скелетов (*Wardichthys inobilis* и *Acroctenolepis nikolaevae*). Оригинал *Reticulolepis insolita* происходит из местонахождения Полдарса. Чешуи *Amblypterina grandicostata* происходят из местонахождения Пронькино, а чешуи *A. pectinata* — из местонахождения Кочевала-2. Оригиналы *Wardichthys inobilis* и *Acroctenolepis nikolaevae* были обнаружены в местонахождении Шихово-Чирки.

Описания изолированных чешуй подготовлены с использованием предложенной Есиным (1990) методики. Отдельные чешуи отсняты в кабинете приборной аналитики ПИН РАН на микроскопах TESCAN VEGA-II XMU и TESCAN VEGA-III XMU (без напыления). Общее фото голотипов *Wardichthys inobilis* и *Acroctenolepis niko-*

Палеонтологический материал: рыбы: *Gnathorhiza cf. otschevi* Minich, *Boreolepis tataricus*, *Toyemia blumentalis* Minich, *Isadia aristoviensis* Minich, *I. cf. suchonensis* Minich, *Isadia sp.*, *Varialepis vitalii* Minich, *Acropholis cf. stensioei* (Есин, 1995б; Tverdokhlebov et al., 2005); тетраподы: *Dvinosaurus primus*, *Karpinskiosaurus ultimus*, *Chroniosuchus paradoxus*, *Kotlassia cf. prima*, *Leogorgon klimovensis*, *Pareiasaurida fam. indet.*, *Peramodon sp.* (Ивахненко и др., 1997); конхостраки *Esteria lineata* Lutk., *E. angulata* Lutk., *E. rotunda* Lutk. и *E. elongata* Netsch. (Ефремов, Вьюшков, 1955).

Стратиграфический уровень: верхнепермский (татарский) отдел, вятский ярус, кутулукская свита (Голубев, Наумчева, 2019).

Шихово-Чирки. Кировская обл., Слободской р-н, правый берег р. Вятка, выше устья р. Чепца, ниже д. Чирки, 22 км от г. Киров. Костеносная зона расположена в северо-восточном углу карьера, около границы полей Шихово-Чирков и земель известкового завода. Подробное описание см. (Гоманьков и др., 1993).

Костеносный уровень: слой 4. Известняк светлый или серый, плотный или мягкий, переслаивающийся с мергелями серыми, иногда слоистыми. Мощность до 9 м (Ефремов, Вьюшков, 1955).

Палеонтологический материал: рыбы: *Kazanichthys viatkensis*, *Samarichthys nikolaevae*, *Palaeoniscum kasanense*, *P. freiselebeni*, *Platysomus biarmicus*, *Elonichthys cf. contortus*, *Kargalichthys pritozensis* (Есин, 1995б); тетраподы: *Leptorophthalmophora*, *Melosaurus platyrhinus*, *Nyctiboetus kassini*, *Platyoposaurus watsoni*; двустворчатые моллюски *Palaeomutela vjatkensis*, *Prilukiella sp.*, *P. lata*; растения *Phyllothea sp.*, *Catamites sp.* (Голубев, 1995).

Стратиграфический уровень: среднепермский (биармийский) отдел, казанский ярус, верхнеказанский подъярус, верхнеуслонские слои (Стратотипический ..., 2001).

НАДКЛАСС OSTEICHTHYES

КЛАСС ACTINOPTERYGII

ОТРЯД ELONICHTHYIFORMES

FAMILIA INC. SED.

Под *Strelnia A. Minich, 2009*

Strelnia insolita (Есин, 1996)

Reticulolepis insolita: Есин, Машин, 1996, с. 284, рис. 5.5-10.

Голотип — ПИН, № 5842/1 [ранее — МГУ, № SU 32 PL 15/1 (Есин, Машин, 1996), на образце номер PL 9/1], чешуя участок В; Вологодская обл., Великоустюгский р-н, местонахождение Полдарса; верхнепермский (татарский) отдел, северодвинский ярус, верхнесеверодвинский подъярус, путятинский горизонт, нижнепутятинский

подгоризонт, полдарсская свита, устьеполдарская пачка.

Описание (по: Есин, Машин, 1996, с изменениями, для чешуй участка В) (рис. 2). Чешуи крупные. Сочленовный шип высокий, с широким основанием. Его средняя линия проходит чуть впереди переднего края свободного поля. Передний край прямой. Антеродорсальный угол сильно вытянут вверх и превышает сочленовный шип. Антеровентральный угол у чешуй из передней части тела срезан крутым углом. Постероventральный угол также срезан, но под незначительным углом. Вентральный край чешуи очень выпуклый, приостренный. Дорсальный край сильновогнутый. Ямка глубокая и длинная, киль хорошо выражен. Свободное поле широкое, у передних чешуй составляет около половины длины чешуи; передний край его почти прямой. Окончания языковидных выступов округлые. Гребни широкие, округлые в сечении. Борозды, разделяющие гребни, в основном неширокие и гораздо уже гребней, вытянуты по диагонали чешуи. В бороздах находятся многочисленные поры. Большинство гребней продолжают до середины чешуи, где они анастомозируют или оканчиваются заостренными выступами. За ними берут начало гребни второго порядка. Некоторые гребни проходят до заднего края чешуи, где, наряду с гребнями второго порядка, оканчиваются лишь немного выходя за край костной пластинки и образуют длинные (пектинатные) зубцы. Наиболее короткие и ярко выраженные гребни наблюдаются в постеродорсальном и антеровентральном углах свободного поля.

Размеры. Длина голотипа (изолированной чешуи) — 0.6 см; высота — 0.6 см. Размеры всей рыбы реконструировать затруднительно.

Сравнение. От сходного вида *S. certa* A. Minich отличается менее ярко выраженной скульптурой: у *S. certa* гребни, образующие скульптуру свободного поля, более выпуклые, а разделяющие их борозды (на соответствующих участках чешуйного покрова) глубже, шире и многочисленнее, чем у *S. insolita*. Так, на чешуях участков В и С рассекающие переднюю часть свободного поля борозды у *S. certa* шире разделяемых ими гребней и проходят дальше, чем у *S. insolita*, а борозды, рассекающие заднюю часть, глубже и берут начало ближе к передней части чешуи. Соответственно, свободное поле в целом более изрезано, а скульптура четче и ярче выражена у *S. certa*.

Замечания. При первом описании (Есин, Машин, 1996) этот вид был отнесен к роду *Reticulolepis* из верхней перми (лопинский отдел) Западной Европы (Aldinger, 1937). Однако, несмотря на определенное сходство с *Reticulolepis*, чешуи *R. insolita* в большей степени похожи на




Рис. 2. *Strelinia insolita* (Esin, 1996): а, г — голотип ПИН, № 5842/1; б, д — экз. ПИН, № 5842/3; в, е — экз. ПИН, № 5842/2; ж, з — детали строения фиг. д, е при большем увеличении; Вологодская обл., Великоустюгский р-н, местонахождение Полдарса; верхнепермский (татарский) отдел, северодвинский ярус, верхнесеверодвинский подъярус, путятинский горизонт, нижнепутятинский подгоризонт, полдарсская свита, устьполдарская пачка. Длина масштабной линейки 5 мм для фиг. а–в, 1 мм для остальных.

Strelnia certa. Соответственно, *S. insolita* должен быть отнесен к роду *Strelnia*, а *Strelnia* и *Reticulolepis* являются близкими родственниками. Мы предполагаем, что *Strelnia insolita* менее специализированный и предковый для *S. certa* вид, что выражено в меньшем развитии у него признаков орнамента чешуи. Это также подтверждается распространением *S. certa* в более молодых частях разреза р. Сухона с устьполдарской по кичугскую пачки (Молостовская и др., 2001).

Распространение. Европейская часть России; верхнепермский (татарский) отдел, северодвинский ярус.

Материал. Кроме голотипа, также в колл. ПИН переданы образцы МГУ №№ SU 32 PL 9/2, 9/4, получившие номера ПИН №№ от 5842/2 и 5842/3 соответственно.

Род *Samarichthys* A. Minich, 1990

Samarichthys nikolaevae (Esin, 1996)

Acrotenolepis nikolaevae: Есин, Машин, 1996, с. 285, рис. 5.5–11 а, б, табл. 5.5–4, фиг. 7–10.

Samarichthys nikolaevae: Миних, Миних, 2009, с. 71, табл. 7, фиг. 6–9.

Голотип – ПИН, № 5802/14 (ранее – МГУ № ШЧ 1/12), скелет рыбы (голова и грудные плавники не сохранились); Кировская обл., Слободской р-н, местонахождение Шихово-Чирки; среднепермский (биармийский) отдел, казанский ярус, верхнеказанский подъярус, верхнеуслонские слои.

Описание (по Есин, Машин, 1996, с изменениями, для чешуй участка В) (рис. 3). Чешуи почти прямоугольной или ромбической формы. Передний край прямой. Погруженное поле узкое, составляет от 1/6 до 1/4 длины чешуи. Нижний край плавно выгнут вниз. Антеровентральный угол слабо скошен; на чешуях передней части тела он заострен и направлен вниз, образуя нижнюю шпору. Шип крупный, высокий, широкий у основания и заостренный на конце. Направлен вертикально вверх. Ямка крупная, глубокая. Киль узкий, расположен впереди шипа. Передний верхний угол низкий, с заостренной вершиной.

Языковидные выступы имеют заостренные окончания. Гребни скульптуры высокие, треугольные в сечении, короткие в постеродорсальной части свободного поля и более длинные, параллельные нижнему краю чешуи в антеровентральной части свободного поля. Гребни несут выраженные гребешки второго порядка, заканчиваются заостренными зубцами, не выходящими за край чешуи. Гребни могут довольно сильно извиваться, соединяться и разделяться на отдельные ветви, однако в целом направлены диагонально. Задний край несет короткие зубцы, которыми оканчиваются доходящие до края гребни. Число их различно.

Размеры. Узнать длину тела голотипа затруднительно из-за неполной сохранности, реконструируемая длина – примерно 25 см.

Сравнение. *S. nikolaevae* очень похож на *S. luxus* (Esin, 1996) но отличается более уплощенными и широкими гребнями, а также прямыми, относительно широкими окончаниями языковидных выступов. Кроме того, четче выделяются зоны длинных продольных гребней в антеровентральной половине свободного поля, и коротких треугольных – в постеродорсальной.

Замечания. При первом описании (Есин, Машин, 1996) голотип был указан, но не изображен. Однако голотип был изображен в неопубликованной диссертации Есина (19956, табл. XIII, фиг. 8), что позволило безошибочно установить его принадлежность. Несмотря на то, что изображение голотипа при его описании желательно, “Международный кодекс зоологической номенклатуры” (2004) не запрещает подобный тип опубликования, то есть *Samarichthys nikolaevae* является валидным таксоном с момента публикации первого описания (Есин, Машин, 1996).

Данный вид впервые был установлен Есиным, но отнесен к роду *Acrotenolepis* (Есин, Машин, 1996). А.В. и М.Г. Миних (2009) отнесли его к ранее описанному роду *Samarichthys*, но рассматривали *S. nikolaevae* как отдельный вид, несмотря на очень значительную степень сходства с *S. luxus*. Оба таксона надежно отличаются только при наличии репрезентативной выборки чешуй.

Распространение. Европейская часть России; среднепермский (биармийский) отдел, казанский ярус, верхнеказанский подъярус.

Материал. В переданной коллекции не удалось обнаружить чешуи МГУ №№ ШЧ 200/3–42, 1–39, 3–4, 3–32 (Есин, Машин, 1996, табл. 5.5–4, фиг. 7–10), кроме тех, что содержатся на голотипе. Однако опубликованные изображения и чешуи голотипа позволяют безошибочно отнести некоторые чешуи из типового местонахождения Шихово-Чирки к этому виду.

ОТ Р Я Д BOBASATRANIFORMES

СЕМЕЙСТВО PLATYSOMIDAE YOUNG, 1866

Род *Kargalichthys* A. Minich, 1990

Kargalichthys pritokensis Minich, 1992

Kargalichthys pritokensis: Миних, 1992, с. 143, табл. II, фиг. 2; Миних, Миних, 2009, с. 162, табл. 46, фиг. 4; табл. 50, фиг. 3.

Wardichthys inobilis: Есин, 1993, с. 131, рис. 1, з, д.

Голотип – СГУ, № 104-Б/2052, группа чешуй; Оренбургская обл., Александровский р-н, местонахождение Притокский; среднепермский (биармийский) отдел, казанский ярус, верхнеказанский подъярус, белебеевская свита.




Рис. 3. *Samarichthys nikolaevae* (Esin, 1996): *a* – голотип ПИН, № 5802/14; *б–к* – то же, детали строения при большем увеличении; Кировская обл., Слободской р-н, местонахождение Шихово-Чирки; среднепермский (биармийский) отдел, казанский ярус, верхнеказанский подъярус, верхнеуслонские слои. Обозначения: Af – анальный плавник; Cf – хвостовой плавник; Df – спинной плавник; H – голова; Pecf – грудной плавник; Pelf – брюшной плавник. Длина масштабной линейки 5 мм для фиг. *a*, 1 мм для остальных.

Описание (по Есин, 1993, с изменениями) (рис. 4). Чешуи высокие, тонкие, прямоугольные. Свободное поле скульптурировано мощными, высокими, короткими и длинными гребнями, от-

дельных зубцов мало. Гребни округло-треугольные (часто – с уплощенной вершиной) в сечении, широкие, толстые, часто соединяющиеся. Борозды между гребнями уже самих гребней, несут мно-




Рис. 4. *Kargalichthys pritokensis* Minich, 1992: *a* – экз. ПИН, № 5802/16; *б–з* – то же, детали строения при большем увеличении; Кировская обл., Слободской р-н, местонахождение Шихово-Чирки; среднепермский (биармийский) отдел, казанский ярус, верхнеказанский подъярус, верхнеуслонские слои. Условные обозначения как на рис. 3. Длина масштабной линейки 5 мм для фиг. *a*, 1 мм для остальных.

гочисленные поры. Скульптура на всех чешуях почти одинакова, а если незначительно изменяется, то не демонстрирует устойчивой закономерности. Края прямые. Антеродорсальный угол практически не выражен, антеровентральный угол часто сильно вытянут вниз. Оба задних угла прямые. Сочленовный шип треугольный, очень высокий и широкий, плоский, основание его часто почти равно ширине чешуи; часто несет вертикальные желобки. Ямка также очень широкая и длинная (обычно достигает примерно до половины высоты чешуи). Киль выражен слабо, в виде плоского вздутия впереди от ямки. Вдоль кия сзади идет вертикальный ряд пор, за которыми расположены беспорядочно разбросанные немногочисленные поры. Погруженное поле занимает $1/2$ – $1/3$ длины чешуи. Передний край свободного поля прямой, окончания языковидных выступов прямые.

Размеры. Узнать длину тела затруднительно из-за значительной деформации. Реконструируемая длина экз. ПИН, № 5802/16 примерно равна 20 см.

Сравнение. От *K. efremovi* отличается скульптурой свободного поля: более широкими, мощными, часто соединяющимися гребнями, гораздо меньшим числом коротких зубцов.

Замечания. Есин (1993) описал *Wardichthys inobilis* как самостоятельный вид, но впоследствии (Миних, Миних, 2009) была продемонстрирована синонимичность этого вида ранее описанному *Kargalichthys pritokensis* Minich, 1992.

Распространение. Европейская часть России; среднепермский (биармийский) отдел, казанский ярус.

Материал. Экз. ПИН, № 5802/16 (ранее — МГУ № 263-2/12, голотип *Wardichthys inobilis*), фрагмент скелета (задняя часть туловища); Кировская обл., Слободской р-н, местонахождение Шихово-Чирки; среднепермский (биармийский) отдел, казанский ярус, верхнеказанский подъярус, верхнеуслонские слои.

ОТ РЯД EURYNOTOIDIFORMES

СЕМЕЙСТВО EURYNOTOIDIDAE MINIKH ET A. MINIKH, 1990

Под *Isadia* A. Minich, 1990

Isadia suchonensis A. Minich, 1990

Табл. XIV, фиг. 1–6 (см. вклейку)

Isadia suchonensis: Миних, А. Миних, 1986, с. 18, рис. 4, in litt.; М. Миних, А. Миних, 1990, с. 94, табл. VI, фиг. 1–4; А. Миних, М. Миних, 2009, с. 195, рис. 28, табл. 59, фиг. 1–6.

Amblypteria pectinata: Есин, Машин, 1996, с. 87, рис. 5.5–126, табл. 5.5-II, фиг. 1–4.

Голотип — СГУ, № 104-Б/3-2а, б, передняя часть тела с головой; Вологодская обл., Великоустюгский р-н, местонахождение Мутовино;

верхнепермский (татарский) отдел, северодвинский ярус, путятинский горизонт, полдарсская свита, кичугская пачка.

Описание (по Есин, Машин, 1996, с изменениями, для чешуй участка А). Чешуи тонкие, передний и задний края прямые. Нижний край сильновыпуклый, верхний сильновогнутый. Антеродорсальный угол высокий, оттянут немного вперед (на некоторых образцах) или прямой, конец заострен. Антеровентральный угол скошен, прямой или немного закругленный, имеет резкий перелом с передним краем. На наиболее крупных чешуях в этом месте есть нижняя шпора. Постеровентральный угол не резко скошен, закруглен, переход к заднему краю плавный. Постеродорсальный угол тупой, несколько приподнят. Сочленовный шип и ямка сильно развитые, высокие, расположены в середине длины чешуи. Сочленовный шип немного ниже антеродорсального угла. Киль плоский, сильно смещен вперед. Между килем и задним краем чешуи располагаются многочисленные, равномерно расположенные поры.

Погруженное поле широкое, занимает $1/2$ – $1/3$ длины чешуи (в редких случаях — около $1/4$). На нем располагаются редкие поры. Передний край свободного поля прямой. Языковидные выступы расположены не на одной линии, имеют окончания различной формы (закругленные, прямые и острые), несут четко выраженные гребешки второго порядка. Разделяющие гребни борозды короткие (доходят не далее конца первой трети свободного поля), неправильной формы или узкие, в основном направлены горизонтально или с небольшим наклоном вниз. Гребни скульптуры короткие, сужаются кзади или не меняют свою ширину, достаточно многочисленные (до 20). Они могут быть весьма резкими, от треугольных до округлых в сечении. Иногда вдоль переднего края свободного поля присутствуют отдельные короткие, треугольные гребни, не соединяющиеся с остальной частью свободного поля. Задняя часть свободного поля несет два–три очень плоских, почти сливающихся с поверхностью вертикальных ряда зубцов; зубцы последнего ряда многочисленные (до 20), серратные. Несколько зубцов также расположено на задней, скошенной и закругленной части нижнего края. Число гребней и зубцов примерно совпадает и, вероятно, связано с возрастом индивида, которому принадлежала чешуя.

Зубы (изображения см. в: Pindakiewicz et al., 2020; Бакаев, 2020; Bakaev et al., in press) *I. suchonensis* грацильные, контрфорс мал, едва достигает основания коронарного расширения (угол между лингвальным краем и длинной осью зуба — около 10° – 15°). Ближе к вершине коронка сильно упло-

щается и загибается лингвально сильнее, чем у других изученных морфотипов. Апикальная часть широкая, примерно в 2.5 раза шире шейки. Передний край зуба загнут лингвально, угол между остью рабочей поверхности и основанием составляет 70° – 80° . Зубцы заостренные, несут характерные широкие, уплощенные режущие канты. Разделяющие их пространства широкие в верхней части, но резко сужающиеся у основания зуба в тонкую щель. Акродиновый колпачок округлый в сечении, составляет не более половины высоты зубца. Рабочая поверхность, образуемая совокупностью зубцов, сильно рассечена и асимметрично выпуклая в латеральной проекции. Самым крупным является предпоследний зубец ряда. Следы прижизненного износа редки и слабо выражены. Площадки истирания выпуклые, а их края расположены как на лабиальной, так и на лингвальной стороне зубцов. Также некоторый износ наблюдается на режущих кантах.

Размеры. Длина рыбы, реконструируемая по голотипу СГУ № 104-Б/3-2 – примерно 15 см.

Сравнение. Данный вид отличается от всех видов *Isadia*: (зубы) удлинённо-конической (не уплощенной) формой зубцов и наличием хорошо развитых режущих кантов, начинающихся от оснований акродиновых колпачков и расширяющихся в базальном направлении; суженными до узких щелей промежутками между основаниями зубцов; образующими не более трети высоты зубца и имеющими округло-коническое окончание акродиновыми колпачками; сильно рассеченной рабочей поверхностью коронок челюстных зубов; (чешуи) тонкими чешуями, зубовидными гребнями скульптуры вдоль переднего края свободного поля, большей уплощенностью гребней свободного поля, лучшим развитием вертикальных рядов плоских, почти сливающихся с поверхностью зубцов. От *I. aristoviensis* вид по зубам дополнительно отличается более широкой коронкой, несущей большее количество зубцов. От *I. arefievii* вид по зубам отличается большим числом зубцов, большей грацильностью зубов, не развитым контрфорсом, сильно изогнутой рабочей поверхностью. От *I. orokiensis* вид по зубам дополнительно отличается большей грацильностью зубов, не развитым контрфорсом, сильно изогнутой рабочей поверхностью.

Распространение. Европейская часть России; верхнепермский (татарский) отдел, с основания северодвинского до кровли вятского яруса.

Материал. В колл. ПИН переданы образцы МГУ №№ МГУ № SU 32 KV 1s, KV 2s, KV 3s, KV 4s, KV 5s и KV 6s, получившие, соответственно,

номера ПИН, №№ 5652/232, 230, 235, 239, 240, 231; Вологодская обл., Нюксеницкий р-н, местонахождение Кочевала-2; северодвинский ярус, верхнесеверодвинский подъярус, путятинский горизонт, полдарская свита.

Isadia aristoviensis A. Minich, 1990

Табл. XIV, фиг. 7–12

Isadia aristoviensis: М. Миних, А. Миних, 1990, с. 96, табл. VII, фиг. 3–7.

Amblypteria grandicostata: Есин, Машин, 1996, с. 87, рис. 5.5-12а, табл. 5.5-II, фиг. 5–7.

Isadia suchonensis: А. Миних, М. Миних, 2009, с. 196, табл. 60, фиг. 1–6.

Голотип – СГУ, № 104-Б/Р-87, фрагмент тела рыбы со спинным и анальным плавниками; Оренбургская обл., Красногвардейский р-н, местонахождение Вязовка; верхнепермский (татарский) отдел, вятский ярус, кутулукская свита.

Описание (по Есин, Машин, 1996, с изменениями, для чешуи участка В). Высота чешуи участка В больше длины в 1.5–2 раза. Передний и задний края прямые; вентральный немного выпуклый, дорсальный немного вогнутый. Антеродорсальный угол на образцах не сохранился. Постероventральный угол не резко скошен, закруглен, переход к заднему краю плавный. Сочленовный шип не сохранился, но, судя по строению ямки, был высоким. Погруженное поле широкое, занимает 1/2 длины чешуи. Передний край свободного поля прямой. Языковидные выступы имеют окончания различной формы (закругленные, острые), несут четко выраженные гребешки второго порядка. Разделяющие гребни борозды короткие, относительно широкие (но значительно уже самих гребней), в основном направлены назад и вниз. Гребни скульптуры короткие, высокие, мощные, часто раздвоенные на переднем конце, округло-треугольные в сечении, представляют собой отдельные короткие, треугольные гребни, заостренные кончики которых нависают над поверхностью свободного поля. За первым рядом коротких гребней находится второй (иногда и третий). Последний ряд таких гребней образует до 10 серратных зубцов на заднем крае. Несколько зубцов также расположены на задней, скошенной и закругленной части нижнего края. Число гребней и зубцов примерно совпадает и, вероятно, связано с возрастом индивида, которому принадлежала чешуя.

Участок С. Чешуи толстые, их высота примерно равна или чуть больше длины. Передний и задний края прямые. Вентральный край слабывыпуклый, дорсальный – слабовогнутый. Антеродорсальный угол высокий, прямой, конец заострен. Антероventральный угол скошен, не-

много закруглен, задненижний угол нерезко срезан или прямой. Сочленовный шип и ямка развитые, относительно высокие, расположены в середине длины. Сочленовный шип обычно достигает высоты переднего верхнего угла. Киль плоско-округлый, немного смещен вперед. Погруженное поле занимает не более 1/3 длины чешуи. Передний край свободного поля прямой. Языковидные выступы расположены на одной линии, имеют окончания различной формы (закругленные и острые), несут гребешки второго порядка. Разделяющие гребни борозды короткие, узкие, глубокие, в основном направлены диагонально. Гребни скульптуры короткие, не меняют свою ширину, относительно малочисленны (до шести), часто раздваиваются на концах. Они могут быть округло-треугольными или округлыми в сечении. Задняя часть свободного поля гладкая.

Зубы тонкие (изображения см.: Pindakiewicz et al., 2020; Бакаев, 2020; Bakaev et al., in press). Контрфорс *I. aristoviensis* небольшой (угол между лингвальным краем и длинной осью зуба — около 15°–20°), но отчетливо выраженный, достигает основания коронарного расширения. Передний край зуба незначительно загнут лингвально, угол между остью рабочей поверхности и основанием составляет 80°–90°. Ближе к вершине коронка сильно уплощается и загибается лингвально. Апикальная часть примерно в 1.5 раза шире шейки. Зуб имеет обычно два или четыре широких лопатовидных зубца прямоугольной (при стирании колпачка) или округло-трапециевидной формы, с крупными акродиновыми колпачками, занимающими около половины высоты зубчиков. Зубцы отчетливо разделены и не смыкаются боковыми сторонами, сохраняя у оснований небольшой, но хорошо выраженный режущий кант. Рабочая кромка выпуклая. Крайние зубцы меньше средних.

Целый череп *I. aristoviensis* неизвестен, но, предположительно, верхнечелюстные зубы у данного вида имеют три-четыре зубца, в то время как у зубов нижней челюсти коронки бикуспидные. Площадки истирания плоские и, как правило, перпендикулярны продольной оси зуба. Почти все зубы несут выраженные следы износа в виде сколов и потертостей. Часто встречаются зубы со стертыми до основания акродиновыми колпачками, в результате чего формируется единая плоская поверхность. При такой степени износа стирание достигает не только дентинных канальцев, но даже пульпарной полости.

Зубы на *palatinum* монокуспидные, тупые, конические, загнутые каудально. Акродиновый колпачок округлый, широкий, в сечении цилиндрический или немного сжатый в кранио-ка-

удальном направлении. Под колпачком основание зуба заметно сужается, формируя перетяжку, а затем вновь образуя расширение. В некоторых случаях это расширение несет небольшие бугорки по бокам от акродинового колпачка.

Размеры. Длина рыбы, реконструируемая по голотипу СГУ, № 104-Б/Р-87 — примерно 40 см (Миних, Миних, 2009).

Сравнение. От всех видов рода *Isadia* этот вид отличается: (зубы) значительно более узкими коронками (апикальная часть не более чем в 1.5 раза шире шейки), акродиновым колпачком, составляющим не более половины высоты зубца, плоскими площадками износа на концах зубцов, ориентированными под прямым углом к продольной оси зубца; (чешуи) длинными, рельефными (округло-треугольными или треугольными в сечении), параллельными друг другу гребнями скульптуры, разделенными глубокими бороздами. По зубам дополнительно отличается: от *I. opokiensis* и *I. arefievi* — грацильностью зубов, слабо развитым контрфорсом; от *I. opokiensis* и *I. suchonensis* — меньшим числом зубцов; от *I. arefievi* — отсутствием увеличенного, шпательевидного зубца.

Распространение. Европейская часть России; верхнепермский (татарский) отдел, верхи северодвинского и вятский ярус.

Материал. В колл. ПИН переданы образцы МГУ №№ PR 203/2s-1, PR 203/2s-2, PR 203/2s-3, PR 203/2s-4, PR 203/2s-5 и PR 203/2s-6, получившие, соответственно, номера ПИН, №№ 5784/2, 11, 5, 8, 9, 12; Оренбургская обл., Сорочинский р-н, местонахождение Пронькино; верхнепермский (татарский) отдел, вятский ярус, кутулукская свита.

Автор благодарен Т.В. Кузнецовой и Е.К. Сычевской за передачу сборов Д.Н. Есина, а также за ценную информацию. Данное исследование осуществлено при поддержке грантов РФФИ №№ 19-34-90040 и 21-54-10003. Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному ун-ту для выполнения государственного задания № 671-2020-0049 в сфере научной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бакаев А.С. Новый морфотип зубов рыб отряда Eurypteroideiformes (Actinopterygii) из верхнепермских отложений Европейской России // Палеонтол. журн. 2020. № 2. С. 78–86.

Бакаев А.С. К ревизии пермских лучеперых рыб Европейской России. Часть 1 // Палеонтол. журн. 2022. № 5. С. 95–102.

Бакаев А.С. История изучения пермских костных рыб европейской части России // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. (в печати).

Голубев В.К. Новые виды *Melosaurus* (Amphibia, Labyrinthodontia) из казанских отложений Прикамья // Палеонтол. журн. 1995. № 3. С. 86–97.

Голубев В.К., Наумчева М.А. Новые данные о возрасте местонахождения пермских тетрапод Пронькино (Оренбургская область) // Палеострат-2019. Годичн. собр. (науч. конф.) секции палеонтол. МОИП и Моск. отд. Палеонтол. об-ва при РАН. М.: ПИН РАН, 2019. С. 23.

Гоманьков А.В., Голубев В.К., Есин Д.Н. и др. Палеонтологическая характеристика верхнепермских отложений местонахождения Шихово-Чирки (бассейн р. Вятка) // Бюлл. Региональной межведомственной стратиграфической комиссии по центру и югу Русской платформы. 1993. Вып. 2. С. 93–96.

Есин Д.Н. Чешуйный покров *Amblypterygia costata* (Eichwald) и таксономия палеонисцид по изолированным чешуям // Палеонтол. журн. 1990. № 2. С. 89–96.

Есин Д.Н. Новые виды высокотелых актиноптеригий (*Platysomidae*) из верхней перми Восточно-Европейской платформы // Палеонтол. журн. 1993. № 3. С. 128–132.

Есин Д.Н. Раннеказанские палеонисциды севера европейской части России и Прикамья // Палеонтол. журн. 1995а. № 2. С. 119–132.

Есин Д.Н. Позднепермские палеонисциды европейской части России. Дис. ... канд. геол.-мин. наук. М., 1995б. 350 с.

Есин Д.Н., Машин В.Л. Ихтиолиты // Стратотипы и опорные разрезы верхней перми Поволжья и Прикамья / Ред. Есаулова Н.К., Лозовский В.Р. Казань: Экоцентр, 1996. С. 270–293.

Ефремов И.А., Вьюшков Б.П. Каталог местонахождений пермских и триасовых наземных позвоночных на территории СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1955. 185 с.

Ивахненко М.Ф., Голубев В.К., Губин Ю.М. и др. Пермские и триасовые тетраподы Восточной Европы. М.: ГЕОС, 1997. 216 с. (Тр. Палеонтол. ин-та РАН. Т. 268).

Миних А.В., Миних М.Г. Новый отряд лучеперых из верхней перми Русской платформы. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1986. 23 с. (Деп. в ВИНТИ 18.04.1986, № 2839-В86).

Миних А.В., Миних М.Г. Ихтиофауна перми Европейской России. Саратов: Изд. центр “Наука”, 2009. 244 с.

Миних М.Г. Новые высокотелые рыбы из верхнепермских отложений Восточно-Европейской платформы // Вопросы палеонтологии (Межвузовский научный сборник). СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1992. С. 137–146.

Миних М.Г., Миних А.В. Ревизия некоторых палеонисков и новые рыбы из верхней перми Восточно-Европейской платформы и возможности использования их в стратиграфии // Вопросы геологии Южного Урала и Нижнего Поволжья. Сб. науч. трудов / Ред. Алешечкин О.И. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1990. С. 84–104.

Международный кодекс зоологической номенклатуры. Изд. 4-е. М.: КМК, 2004. 223 с.

Молостовская И.И., Миних М.Г., Молостовский Э.А., Миних А.В. О выборе эталонного разреза татарских отложений стратотипической области // Проблемные вопросы региональной и местной стратиграфии фанерозоя Поволжья и Прикаспия. Матер. конф. Саратов: НВ НИИГГ, 2001. С. 38–39.

Стратотипический разрез татарского яруса на реке Вятке. М.: ГЕОС, 2001. 140 с. (Тр. Геол. ин-та РАН. Вып. 532).

Татарские слои реки Сухоны / Ред. Молостовский Э.А., Миних А.В. Саратов: Научн. книга, 2001. 204 с.

Aldinger H. Permisch Ganoidfische Oströnland // Medd. Grönland. 1937. V. 102. № 3. 392 p.

Bakaev A.S., Bulanov V.V., Kogan I. et al. Early ray-finned herbivores: the dental system of Eurynotoidiidae (Actinopterygii; Middle–Late Permian, European Russia) and its implications for palaeobiology and palaeoecology // Palaeontology. (in press).

Pindakiewicz M., Tałanda M., Sulej T. et al. New finds of teeth of the herbivorous actinopterygians from the latest Permian of East European Platform and feeding convergence among extinct and extant ray-finned fish // Acta Palaeontol. Pol. 2020. V. 65. № 1. P. 71–79.

Объяснение к таблице XIV

Фиг. 1–6. *Isadia suchonensis* A. Minich, 1990; изолированные чешуи различных участков тела, вид с внешней стороны: 1 – чешуя участка А, экз. ПИН, № 5652/230; 2 – чешуя участка В, экз. ПИН, № 5652/232; 3 – чешуя участка С, экз. ПИН, № 5652/235; 4 – чешуя участка F, экз. ПИН, № 5652/239; 5 – коньковая чешуя, экз. ПИН, № 5652/240; 6 – чешуя участка В, экз. ПИН, № 5652/231; Вологодская обл., Нюксеницкий р-н, местонахождение Кочевала-2; верхнепермский (татарский) отдел, северодвинский ярус, верхнесеверодвинский подъярус, путятинский горизонт, полдарская свита.

Фиг. 7–12. *Isadia aristoviensis* A. Minich, 1990, изолированные чешуи различных участков тела, вид с внешней стороны: 7 – чешуя участка С, экз. ПИН, № 5784/9; 8 – чешуя участка Е, экз. ПИН, № 5784/8; 9 – чешуя участка А, экз. ПИН, № 5784/11; 10 – чешуя участка С, экз. ПИН, № 5784/5; 11 – чешуя участка D, экз. ПИН, № 5784/12; 12 – чешуя участка В, экз. ПИН, № 5784/2; Оренбургская обл., Сорочинский р-н, местонахождение Пронькино; верхнепермский (татарский) отдел, вятский ярус, кутулукская свита.

Длина масштабной линейки 0.5 мм.

To a Revision of Permian Ray-Finned Fishes from European Russia. Part 2

A. S. Bakaev

Borissiak Paleontological Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117647 Russia

Part of the Permian ray-finned fishes originals from the European Russia from the collection of D.N. Esin, which was transferred to the Borissiak Paleontological Institute of Russian Academy of Sciences (PIN RAN), are revised. The diagnoses and images of taxa that have changed the original (assigned at the first description) systematic status are given: *Reticulolepis insolita* (renamed *Strelnia insolita*), *Samarichthys nikolaevae* (renamed *Acroctenolepis nikolaevae*), *Wardichthys inobilis* (junior synonym of *Kargalichthys pritokensis*), *Amblypterina pectinata* (junior synonym of *Isadia suchonensis*) *Amblypterina grandicostata* (junior synonym of *Isadia aristoviensis*). At the same time, the image of the holotypes of *Reticulolepis insolita* and *Samarichthys nikolaevae* is presented in the open press for the first time.

Keywords: Actinopterygii, scales, Permian, East Europe, stratigraphy

